

Hội chứng Pica triệu chứng cách chữa

hội chứng Pica bằng phương pháp dân gian liên lạc là chúng ăn bậy. Hội chứng này sẽ làm cho người bị bệnh thèm ăn bất cứ thứ gì kể cả vật không tốt dành cho Chính Mình, rõ ràng như những dạng đất đá, cát, đinh mắc rỉ sắt,... Theo hướng dẫn y tế trên thế giới, hội chứng này sẽ được xếp đăng nhập dạng rối loạn về ăn uống. Mời Các bạn tham khảo bài viết sau đây nhằm nắm những hiểu biết cụ thể hơn.

nguyên cứu đôi nét về hội chứng Pica

hội chứng Pica là biểu hiện 1 người thèm ăn những vật thể bên ngoài thực phẩm và có thể độc hại tới người như đinh, đất, đá, tóc, bã cà phê, giấy, kim dạng, tàn thuốc lá, sỏi, phân động vật, dây thun, dầu gội ban đầu,... hội chứng ăn bậy này được ghi nhận hàng đầu khoảng tầm 25 - 30% trẻ em. 1 tỷ lệ ít gặp sẽ thấy ở phụ nữ đang mang thai.

trong số đó, những mẹ bầu bị phải hội chứng này thường hay chọn lọc ăn những dạng đất, đất sét và bột giặt. Ngoài ra, phụ nữ đang mang thai còn thèm ăn cả que diêm cháy, than, đá xanh, long bộ não, nước đá, kem đánh răng, thạch lớn, bã trà, tàn thuốc, phân gà,... đa số những dạng này đều không tốt và có thể đe dọa xấu tới Chính Mình thời kỳ thai nghén.

Pica thường hay dễ phát triển ở những thành phần đang thấy băn khoăn về Chính Mình thần kinh. Nhưng mà, không phải tất cả những người mắc hội chứng này đều liệu có băn khoăn về Chính Mình thần kinh. Ngoài ra, Pica còn diễn ra hay bắt gặp hơn ở trẻ em. Những trẻ bị phải hội chứng này có thể giấu diếm hành vi lúc tiếp xúc đối với phụ huynh hoặc người chăm sóc.

những thành phần thường hay bị phải hội chứng Pica đó là:

- người mắc tự kỷ.
- phụ nữ đang mang thai.
- người tới từ những quốc gia liệu có lối sống ăn đất thường hay diễn ra hay bắt gặp.

nguyên do gây ra trẻ em mắc hội chứng Pica

Theo những nghiên cứu trước kia, hội chứng này liệu có nguyên do bắt nguồn khăng khít từ những băn khoăn dưới đây:

- Trong thời kỳ thai kỳ;
- Tự kỷ, thiếu năng trí tuệ;
- Chính Mình về tâm thần;
- Suy dưỡng chất, thiếu máu, thiếu sắt;
- những quốc gia liệu có nền văn hoá độc bất bình thường hoặc coi những dạng phi vật chất là thứ thiêng liêng hoặc có thể chữa trị căn bệnh, rõ ràng như họ cho rằng việc ăn đất đá có thể chữa trị được những căn bệnh nan y.

hội chứng Pica gây ra những biểu hiện gì?

biểu hiện đặc trưng của Pica là ăn những món khác không phải là thực phẩm. Những người mắc Pica sẽ nỗ lực ăn những dạng phi thực phẩm. Biểu hiện này khác đối với hành vi bình thường đưa đồ vật đăng nhập miệng của trẻ lộn xộn hoặc trẻ em.

người bị bệnh mắc hội chứng Pica có thể phát triển và gây ra 1 loạt biểu hiện khác như:

- Sâu răng, răng mắc hỏng;
- cảm giác đau bụng;
- Phân liệu có máu;
- Ngộ độc chì;
- những người bị bệnh mắc Pica sẽ thiếu hụt chất dưỡng chất.

tai biến khó lường lúc mắc hội chứng Pica

những dạng Pica lúc đổi thành biến trầm trọng có thể gây ra đe dọa tới mạng sống. Rõ ràng như lúc người bị bệnh thèm ăn những đám sơn cũ từng mắc bong ra rất nguy hại. Những đám sơn từ những tòa nhà cũ có thể đựng chì và gây ra bị nhiễm độc chì.

Ngoài ra, hội chứng này còn liệu có những tai biến khác bao gồm:

- Ngộ độc;
- Tắc con đường thở bởi vì ăn đất đá to hoặc cát bay đẳng nhập phổi;
- gây ra hại dành cho bộ não bởi vì bị nhiễm độc lúc ăn chì hoặc những chất liệu có hại khác;
- Gãy răng bởi vì ăn những đồ vật cứng;
- gây ra hại tới hệ tiêu hóa, khiến thương tích cổ họng và dạ dày;
- bị phải những băn khoăn về con đường tiêu hóa như phân kèm theo máu, táo bón, đi tả,...
- Tắc ruột bởi vì khó tiêu hóa hoặc mắc ứ đọng những dạng thực phẩm khác trong ruột.

làm sao nhằm chữa trị hội chứng Pica?

lúc ăn những vật không phải thực phẩm dễ gây ra băn khoăn như cảm giác đau dạ dày hoặc mắc gãy răng. Bởi vậy, việc chữa trị hội chứng này thường hay bắt ban đầu bằng giải pháp giải quyết những tai biến trước tiên. đối với người bị bệnh từng mắc ngộ độc chì, mắc nhiễm trùng hoặc biểu hiện khác bởi vì Pica cần phải liệu có giải pháp giải quyết thích hợp hơn. Trong tình huống này, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn sử dụng kháng để hoặc tiến hành tiểu phẫu nhằm sử dụng vật thể ra.

lúc bắt ban đầu chữa trị Pica, bác sĩ chuyên khoa nhất thiết định vị rõ ràng nguyên do làm cho người bị bệnh mắc thèm ăn những đồ vật phi thực phẩm. Việc này có thể mối quan hệ tới những biểu hiện căn bệnh y tế hoặc những nhân tố nào đó. Lúc này, người bị bệnh sẽ được chỉ dẫn khiến xét nghiệm máu nhằm xét nghiệm tình trạng thiếu hụt dưỡng chất.

những băn khoăn bác sĩ chuyên khoa tiến hành bao gồm:

- tìm ra cảm giác lúc người bị bệnh nhai những thứ phi thực phẩm.
- nghiên cứu coi người bị bệnh liệu có thực sự hiểu rằng những thứ này không ăn được nhưng mà họ chưa thể kiểm chế cảm giác thèm.
- trao đổi nhằm hỏi thêm về niềm tin văn hóa lân cận những thứ phi thực phẩm này.

chọn lọc chữa trị hội chứng Pica như:

- hỗ trợ cảm giác dành cho căn bệnh nhân: Đưa ra 1 dạng thực phẩm dùng biện pháp an toàn hơn nhằm họ nhai lúc thấy con thèm.
- sử dụng thuốc nhằm chữa trị những về Chính Minh thần kinh tiềm tàng hoặc bổ sung chất dưỡng chất thiếu hụt trong người.
- những phụ nữ sẽ hết mắc chứng Pica sau đây sinh con.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
