

Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Kháng sinh ngừa thai cấp bách là biện pháp ngừa thai đạt kết quả lên đến 90% trong vòng 120 giờ (5 ngày) hoặc 72 giờ (3 ngày) tùy loại thuốc dưới lúc phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Tuy vậy, nữ chỉ cần phải uống thuốc ngừa thai trong giới hạn đồng ý, Nếu mà dùng quá nhiều quá mức có nguy cơ gặp tác dụng phụ Cùng với nhiều hệ lụy tính mạng.

Bài văn bài viết này được giải đáp chuyên môn vì ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ Trung tâm phụ khoa bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ chia sẻ những kiến thức chi tiết về *Thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc*, cách lấy thuốc kháng sinh khoa học Để tránh những tác dụng phụ chi phối tới sức khỏe và khả năng sinh con của nữ.

Thuốc tránh thai cấp tốc là gì?

Thuốc phòng tránh thai khẩn cấp (Emergency Contraceptive Pills) là cách ngừa thai được lấy sau khi nảy sinh "lâm trận" tình dục không an toàn như "yêu" tình dục không an toàn, chị em bị cưỡng hiếp hoặc thì có dùng giải pháp bảo vệ không giống tuy nhiên lo sợ thất bại. (1)

Đối tượng chủ yếu của thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp chứa hàm lượng rất lớn hormone sinh dục nữ Progesterone. Nguyên tắc phòng tránh thai giống thuốc tránh thai liên tục, nhưng sự không giống hàm số lượng Progestin chủ yếu là điểm khác, giúp cho dạng thuốc này phỏng đoán chức năng tránh thai nhanh chóng.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện chuyên khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc là biện pháp hữu hiệu kết luận các trường hợp "cấp bách" – có nguy cơ có bầu dưới khi phát sinh "yêu" tình dục không an toàn. Liệu có 3 nhóm đối tượng lấy hay bắt gặp nhất là:

- Nhóm thứ nhất: người không liên tục "lâm trận" tình dục, người chưa có hoặc chưa thể sử dụng những phương pháp ngăn ngừa mang bầu bên ngoài ý định như dùng thuốc kháng sinh ngừa thai thường xuyên, đặt khoảng tránh thai, sử dụng lát dán phòng tránh thai hay chưa có sẵn bao dài su...

- Nhóm thứ hai: người bị hiếp dâm hoặc cưỡng bức diễn ra vấn đề "yêu" tình dục cần không muốn có bầu.
- Nhóm thứ ba: cơ thể đã từng dùng những biện pháp phòng tránh thai không giống nhưng mà hoang mang bất thành, chẳng hạn như quên dùng kháng sinh ngừa thai thường xuyên, lấy thuốc kháng sinh tiêm phòng tránh thai tuy nhiên thời điểm tiêm mắc trễ so đối với chu kỳ quy định, bao cao su bị thủng hoặc mắc rách...

Khảo sát cho rằng, thuốc phòng tránh thai khẩn cấp đạt kết quả ngừa thai lên tới 90% trong tầm một ngày ban đầu sau lúc nảy sinh "lâm trận" tình dục không được bảo vệ. Nếu như sử dụng càng muộn dưới khi giao hợp hữu hiệu ngừa thai càng thấp hơn. Tùy kiểu kháng sinh mà hiệu quả ngừa thai sẽ mất đi Nếu như vượt quá khoảng thời gian cho biết phép: 120 giờ (5 ngày) hay 72 giờ (3 ngày). (2)

- trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha
- [chất lượng phòng khám thái hà phòng khám uy tín hà nội khám nam khoa ở đâu tốt nhất hà nội bệnh viện chữa yếu sinh lý chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất bệnh viện cắt bao quy đầu giá cắt bao quy đầu địa chỉ khám trĩ ở hà nội cắt trĩ ngoại bao nhiêu tiền phòng khám phụ khoa uy tín khám phụ khoa giá bao nhiêu phương pháp phá thai an toàn phá thai bằng thuốc giá bao nhiêu địa chỉ phá thai chữa sùi mào gà ở đâu tốt nhất chi phí chữa sùi mào gà cắt tuyến mô hôi nách ở bệnh viện nào phòng khám đa khoa thái hà hà nội danh sách các phòng khám đa khoa tại hà nội địa chỉ phòng khám nam khoa khám yếu sinh lý ở đâu tốt nhất khám xuất tinh sớm ở đâu ở đâu tốt nhất tại Hà Nội cắt bao quy đầu ở đâu tốt cắt bao quy đầu chi phí bao nhiêu mổ trĩ ở đâu tốt nhất phẫu thuật trĩ bao nhiêu tiền phòng khám phụ khoa uy tín hà nội bảng giá khám phụ khoa cách phá thai an toàn nhất thuốc phá thai bao nhiêu tiền cơ sở phá thai an toàn ở hà nội xét nghiệm bệnh sùi mào gà ở đâu chi phí điều trị sùi mào gà bệnh lậu khám ở đâu khám bệnh giang mai trị hôi nách ở đâu](#)

Cơ chế hoạt động của thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc

Khi được đút vào cơ thể, các thành phần nội bài tiết liệu có trong thuốc kháng sinh ngừa thai cấp bách sẽ dẫn tới tác động, khiến ngăn cản việc trứng rụng thiên nhiên ở phái đẹp, nhờ đó ngăn cản sự gặp gỡ và diễn ra thụ thai giữa trứng cùng với tinh binh.

Trong trường hợp trứng đã thụ tinh, kháng sinh sẽ ngăn không chặn đoán nội mạc tử cung trở thành cửa sổ khiến cho tổ, trở ngại việc gây tổ của phôi thai trong lòng dạ con. Nếu mà quá trình gây tổ đã từng diễn ra, thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc không khiến dứt đoạn việc mang bầu.

Bác sĩ Thanh Thảo nhấn mạnh, cần phải phân biệt đặc trưng kháng sinh tránh thai cấp tốc cũng như thuốc kháng sinh phá thai. Kháng sinh tránh thai khẩn cấp KHÔNG phải là kháng sinh bỏ thai. Cơ chế vận động của kháng sinh ngừa thai cấp bách chính là ngăn cản không kết luận tinh trùng gặp trứng bằng giải pháp cản trở việc trứng rụng. Tức là thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc chỉ ngăn cản việc có thai, không phải chấm dứt việc có bầu.

Các loại thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp thường thấy Hiện nay

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo cho biết, kháng sinh tránh thai khẩn cấp Phát huy hiệu quả phòng tránh thai tối đa Nếu sử dụng Tức khắc dưới lúc nảy sinh "làm chuyện ấy" không an toàn. Ngày nay, Vừa rồi thị trường liệu có rất nhiều loại kháng sinh, hay bắt gặp đặc biệt là kiểu 72 giờ cũng như 120 giờ, ít hay bắt gặp hơn là các kiểu 24 giờ, 36 giờ hay hai ngày. (3)

Các dạng kháng sinh tránh thai cấp tốc được phân dạng thành dạng một viên hoặc dạng 2 viên, Bởi vì thế cách lấy cũng khác biệt nhau.

Thuốc ngừa thai cấp tốc kiểu một viên

Thuốc phòng tránh thai cấp bách loại 1 viên được rất nhiều người chọn lựa do mức độ phổ biến Trên đây thị trường cũng như tính tiện lợi khi dùng. Phần lớn một số viên thuốc dạng này chỉ cho hiệu quả ngăn ngừa vấn đề có thai ngoài ý định Nếu mà lấy trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau lúc phát sinh "làm chuyện ấy" tình dục không sử dụng bao cao su.

Theo thống kê, thời điểm dùng thuốc càng sớm thì hiệu quả phòng tránh thai càng lớn. Rõ ràng là:

- Uống kháng sinh trong tầm một ngày đầu tiên: hiệu quả ngừa thai là 90%;
- Khoảng 25-48 giờ tiếp theo: hiệu quả phòng tránh thai là 85%;
- Khoảng 49-72 giờ tiếp theo: hữu hiệu phòng tránh thai là 58%;

- Vượt quá 72 giờ: Nếu mà trứng và tinh binh đã từng thụ thai cũng như gây tổ trong tử cung, thuốc kháng sinh mất đi chức năng bảo vệ.

Một số nhãn hiệu thuốc tránh thai kiểu một viên đang thường bắt gặp Trên đây thị trường gồm:

- Postinor-1®: có thành phần Levonorgestrel hàm số lượng 1,5mg, liều sử dụng một viên duy nhất.
- Mifestad 10®: thành phần đựng Mifepristone (chất đối kháng Progestin) hàm số lượng 10mg đạt hiệu quả ngừa thai an toàn.
- Bocinor®: thành phần Levonorgestrel hàm số lượng một,5mg đóng gói loại 1 viên nén/1 vỉ.
- Lys®: chứa Levonorgestrel hàm lượng 0,75mg, thường lấy cho tình huống không "lâm trận" liên tục hoặc liệu có "lâm trận" tình dục đột xuất.
- Ciel EC 25®: thích hợp phỏng đoán tình huống "lâm trận" tình dục lần thứ nhất không dùng cách ngừa thai, bị hiệp dâm hoặc cưỡng bức "yêu" tình dục.
- Naphamife®: 1 nhãn hiệu thuốc kháng sinh được sản sinh tại Việt bạn nam, có đối tượng Mifepristone 10mg Cùng nhiều tá dược.

Thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách loại 2 viên

Thuốc kháng sinh tránh thai kiểu 2 viên ít thường gặp hơn. Quy biện pháp đóng gói 2 viên thuốc/hộp, từng viên đựng 0,75mg Levonorgestrel. Viên thứ nhất sử dụng càng sớm càng tốt dưới lúc nảy sinh "lâm trận" không sử dụng bao cao su, không vượt quá 72 giờ. Viên thứ hai dùng dưới viên thứ nhất 12 giờ, không Để quá 16 giờ. Thuốc chỉ Bổ sung hữu hiệu phòng tránh thai lúc người sử dụng sử dụng đủ cũng như đúng 2 viên theo khoảng thời gian nguyên tắc.

Một số nhãn hiệu thuốc ngừa thai cấp tốc loại 2 viên thường bắt gặp Vừa rồi thị trường gồm:

- Postinor-2®: Nhãn hiệu kháng sinh thường thấy nhất, gồm 2 viên nén chứa đối tượng Levonorgestrel hàm số lượng 0,75mg tại từng viên.
- Happynor®: Nhãn hiệu thuốc được tạo ra tại Việt đàn ông, 1 hộp thuốc gồm 2 viên, từng viên đựng hàm số lượng 0,75mg Levonorgestrel.
- Posinight 2®: thành phần cũng như cơ chế đe dọa giống như 2 nhãn hiệu Trên.

Chuyên gia Thanh Thảo nhấn mạnh, khi sử dụng thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách, người sử dụng nên hiểu rõ chính mình sử dụng kiểu 1 viên hoặc 2 viên Nhằm sử dụng đúng, tránh việc sử dụng sai lầm làm cho mất hữu hiệu ngừa thai.

Hữu hiệu của thuốc kháng sinh tránh thai cấp tốc sau khi uống

Bình thường, phái đẹp không mang bầu Tức thì dưới khi thì có "yêu" tình dục. Tinh binh sẽ sống sót trong cơ thể cơ thể chị em phụ nữ trong tầm 5 ngày. Tại thời gian đó, Nếu như xảy ra tình trạng rụng trứng, tinh trùng bắt gặp trứng cùng với thụ thai sẽ đạt kết quả có bầu. (4)

Thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc liệu có trách nhiệm cản trở quá trình rụng trứng thiên nhiên diễn ra, ngăn không chặn đoán buồng trứng bắt thích trứng. Chính Bởi vậy, Nếu như trứng đã rụng, trứng cũng như tinh binh từng thấy nhau, đã thụ thai và đã từng làm tổ trong niêm mạc dạ con thì thuốc kháng sinh mất đi tác dụng.

Đó chủ yếu là lý vì tại sao những chuyên gia y tế khuyên rằng nữ cần phải uống càng sớm càng tốt sau khi nảy sinh quan hệ tình dục không an toàn Nếu không muốn mang bầu.

Tuy vậy, thống kê cho biết tầm 1-2% trường hợp chị em phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai cấp bách vẫn mang bầu Cho dù đã từng dùng thuốc trong khoảng 72 giờ (3 ngày) dưới lúc nảy sinh "yêu" tình dục không được bảo vệ.

Tức là, kháng sinh ngừa thai cấp bách không bảo vệ tuyệt đối được tất cả các trường hợp mang thai phía ngoài ý định. Nếu như dưới lúc sử dụng thuốc tránh thai không xuất hiện xuất hiện "rụng râu" vào chu kỳ kinh nguyệt tiếp, phụ nữ nên kiểm tra sớm Để được xác định chắc hẳn việc mang bầu hay không.

Cần phải sử dụng thuốc kháng sinh ngừa thai lúc nào?

Thuốc phòng tránh thai cấp tốc cần phải sử dụng trong những trường hợp phát sinh "yêu" tình dục không được bảo vệ mà không muốn có bầu. Cụ thể là:

- Không có hay chưa thể dùng giải pháp phòng tránh thai nào.
- Bị hiệp dâm hay cưỡng bức quan hệ tình dục không an toàn.
- lo ngại về khả năng phòng tránh thai bất thành khi dùng giải pháp ngừa thai không giống như:
 - Bao cao su bị rách, thủng, lật hay sử dụng sai lệch phương pháp.
 - Quên sử dụng thuốc kháng sinh phòng tránh thai phối hợp Từ 3 viên trở lên hay kinh nguyệt đến trễ 3 ngày so với chu kỳ thường thì.
 - Trễ 3 giờ so với thời gian dùng thuốc thường xuyên chỉ định Progestin.
 - Kinh nguyệt đến trễ 7 ngày với thuốc tránh thai kiểu tiêm phối hợp.
 - Lộn vòng ngừa thai hoặc que cấy phòng tránh thai nội tiết tố.
 - Rút dương vật không thành công, như bắn tinh vào "cô bé" hay Trên đây cơ quan sinh dục bên ngoài.
 - Đặc tính toán không đúng thời gian kiêng cử.

Các tác dụng phụ lúc sử dụng thuốc phòng tránh thai cấp bách

Bác sĩ Thanh Thảo cho rằng, Dù cho kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp đạt hiệu quả ngừa thai mau chóng cùng với hữu hiệu lên đến 90%, nhưng Nếu mà sử dụng sai lầm biện pháp hay lạm dụng thuốc kháng sinh có khả năng dẫn đến không ít phản ứng phụ, nhiều ngày có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy nặng đe dọa đến tính mạng người sử dụng.

Một vài tác dụng phụ phổ biến của kháng sinh ồm:

- **Biến đổi vòng kinh nguyệt:** Là phản ứng phụ phổ biến nhất, có nguy cơ thấy Nhanh chóng Từ lần đầu uống thuốc kháng sinh phòng tránh thai hoặc dưới nhiều lần sử dụng. Phái đẹp có thể xuất hiện "đèn đỏ" đến sớm hơn hoặc muộn hơn so với chu kỳ bình thường. Nếu muộn hơn 1 tuần, phái đẹp cần dùng que thử thai hay xét nghiệm với bác sĩ chuyên khoa Nhằm được làm cho những kiểm tra cần thiết, định vị chắc hẳn việc có thai hay không.
- **Chảy máu dạ con bất thường:** một số trường hợp nữ giới mắc chảy máu sau uống thuốc kháng sinh, Đó là phản ứng phụ sẽ mau chóng biến mất. Nếu mà dưới 2 hôm vẫn mắc ra máu, chị em phụ nữ cần phải kiểm tra Tức thì Để kiểm tra khả năng bị bệnh lý trầm trọng.
- **Hoa mắt, mót nôn, nôn:** khoảng 50% tình huống bị phải hiện tượng này, tuy vậy chị em không nên lo lắng, triệu chứng sẽ tự không còn

nửa dưới 1-2 tuần hoặc kịp thời hơn. Nếu mà sau khoảng thời gian Trên dấu hiệu không tăng cường, chị em phụ nữ cần phải thăm khám Nhằm tìm tác nhân tiềm ẩn khác biệt.

- Đau bụng dưới: Số ít trường hợp gặp phải triệu chứng đau đớn bụng dưới quần quai. Trong tình huống này, phái đẹp cần phải thăm khám sớm Nhằm xác định căn nguyên chuẩn xác của biểu hiện, kiểu trừ tác nhân có bầu bên ngoài dạ con - 1 biến chứng có nguy cơ mắc phải Nếu mà ngừa thai thất bại với giải pháp uống kháng sinh ngừa thai cấp bách.
- Tình huống dùng quá nhiều thuốc kháng sinh quá nhiều khiến cho người không dung nạp thuốc kháng sinh có nguy cơ khiến cho chị em phụ nữ bắt gặp các phản ứng phụ lâu ngày khác như stress hay trầm cảm, Nâng cao cân không tự chủ, thay đổi huyết áp và hô hấp...

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo khuyến cáo chị em phụ nữ tránh dùng quá nhiều sử dụng thuốc ngừa thai cấp tốc, chỉ dùng trong tình huống thật quá trình cần thiết. Tốt hơn hết cần vận dụng ý kiến chuyên gia Để được trả lời, hướng dẫn phương pháp phòng tránh thai phù hợp và an toàn.

Ai có thể uống kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp?

Hầu hết chị em Thường có nguy cơ lấy thuốc kháng sinh ngừa thai cấp bách, bao gồm các trường hợp chưa thể sử dụng giải pháp ngừa thai nội đạo thải tố như kháng sinh tránh thai liên tiếp hay miếng dán phòng tránh thai.

Nhưng, nữ chớ nên sử dụng kháng sinh ngừa thai khẩn cấp Nếu dị ứng đối với bất kỳ thành phần nào của thuốc kháng sinh, hay nhiễm bệnh lý có khả năng tương tác đối với kháng sinh. Thông báo bệnh tình lý hoặc dị ứng đối với chuyên gia, dược sĩ Nhằm được trả lời lấy thì có an toàn hay không.

Các trường hợp chống chỉ dẫn đối với thuốc ngừa thai cấp bách

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, các tình huống bài viết này hạn chế dùng thuốc kháng sinh tránh thai cấp tốc, bao gồm:

- Nữ giới đang có thai hoặc nghi ngờ mang thai;
- Chị em phụ nữ xuất hiện tình trạng xuất huyết "cô bé" thất thường mà không Rõ ràng nguyên nhân;

- Chị em phụ nữ thì có tiền sử căn bệnh nhiễm trùng tắc tĩnh mạch hay bệnh huyết khối.

Các trường hợp cần phải thận trọng lúc dùng thuốc kháng sinh tránh thai, tốt nhất cần phải thông báo đối với bác sĩ chuyên khoa hay dược sĩ Nhằm được tư vấn kỹ, gồm:

- Phụ nữ bị bệnh bệnh đái đường liệu có biến chứng;
- Phái đẹp thì có tiền sử rối loạn tuần hoàn máu não;
- Phái đẹp nhiễm bệnh tim mạch, căn bệnh động kinh...

Một số lưu ý khi lấy thuốc ngừa thai khẩn cấp

Thuốc phòng tránh thai cấp tốc thì có hai mặt lợi cùng với hại cụ thể, Vì vậy chị em cần trang mắc chẩn đoán chính mình các kiến thức về cách dùng Để bảo vệ tính mạng bản thân. Sau đây là những lưu ý khi uống thuốc kháng sinh chị em cần phải biết:

- Chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp thực quá trình quan trọng. Đọc kỹ càng chỉ dẫn sử dụng hoặc vận dụng ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi uống. Không sử dụng quá 2 lần/tháng và 3 lần/năm Nhằm tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh con của nữ giới.
- Nên uống thuốc sớm nhất dưới lúc phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su Để cho hiệu quả ngừa thai dài nhất.
- Uống rất nhiều viên thuốc phòng tránh thai cấp tốc không gây Tăng hữu hiệu phòng tránh thai, Ngược lại Nâng cao nguy cơ gặp tác dụng phụ nặng nề bởi vì người không hấp thụ thuốc kháng sinh. Chính vì vậy, chị em phụ nữ chỉ cần sử dụng đầy đủ và đúng theo khuyến cáo.
- Không sử dụng thuốc kháng sinh trong các tình huống đang có thai hoặc nghi ngờ mang bầu, đang chữa trị bệnh lý như bệnh tiểu đường, tim mạch, động kinh, biến đổi tuần hoàn máu não...
- Trong trường hợp bắt gặp tác dụng phụ sau dùng thuốc kháng sinh, Nếu các dấu hiệu nhận biết lâu ngày với tần suất không bình thường, chị em phụ nữ cần thăm khám Ngay Để dạng trừ những trường hợp chứng bệnh trầm trọng.

Một số vấn đề phổ biến

1. Uống thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách thì có có bầu không?

Chưa có một cách ngừa thai nào cho kết quả phòng tránh thai 100%. Khảo sát cho thấy, khoảng 1-2% tình huống vẫn có bầu Mặc dù sử dụng thuốc kháng sinh ngừa thai Liên dưới lúc "âm trậ" tình dục không được bảo vệ.

Vì thế, dưới khi dùng thuốc kháng sinh, Nếu như nhận thấy "rụng râu" tới chậm hơn 7 ngày so với vòng kinh thường thì, phụ nữ cần phải dùng que thử hoặc xét nghiệm đối với bác sĩ Để được khiến cho các xét nghiệm cấp thiết, định vị chắc chắn liệu có có thai hay không.

2. Dùng thuốc phòng tránh thai cấp bách thì có tác động chức năng mang thai sau này không?

Cơ chế vận động của thuốc kháng sinh là trở ngại quá trình trứng rụng tự nhiên, không khiến cho đứt quãng quá trình tiến triển của phôi thai trong tình huống trứng từng thụ tinh và khiến tổ trong niêm mạc tử cung. Chính Do đó, thuốc ngừa thai cấp bách không làm cho nguy hiểm tới khả năng có bầu của nữ giới về sau.

3. Làm sao Để biết thuốc tránh thai cấp tốc có hiệu quả hay không?

Dưới lúc uống thuốc kháng sinh, Nếu mà thấy hành kinh vẫn thấy như các chu kỳ bình thường, Như là biểu hiện tránh thai thành công. Nhưng mà, Nhằm có kết trái chắc chắn, nữ giới nên đợi ít nhất một vài tuần, Tiếp đó sử dụng que thử thai Để kiểm chứng tránh thai thành quả hoặc không.

4. Thì có nên uống rất nhiều viên kháng sinh ngừa thai cấp tốc Để Nâng cao hữu hiệu tránh thai không?

Câu trả lời là không. Uống rất nhiều viên Với lúc không khiến cho Nâng cao hiệu quả phòng tránh thai, Ngược lại còn gây Nâng cao khả năng bắt gặp nhiều phản ứng phụ trầm trọng vì người chưa thể hấp thu. Nhiều trường hợp lạm dụng kháng sinh có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu khó chịu tại dạ dày. Khuyến cáo chỉ cần phải sử dụng tối đa 2 viên/tháng hay 3 viên/năm Nhằm đảm bảo không tác động tới chức năng có con của nữ giới.

Tình huống bị nôn sau khi dùng thuốc, cần phải quan sát khoảng thời gian nôn sau lúc dùng thuốc bao nhiêu phút. Nếu như bị nôn trong vòng 1 giờ, chị em có khả năng dùng thêm 1 viên Để đảm bảo hiệu quả tránh thai.

5. Lúc nào cần đến gặp bác sĩ?

Sau lúc dùng kháng sinh phòng tránh thai, Nếu như mắc phải bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, phải đẹp cần đến Túc thì bệnh viện Nhằm được bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm cùng với xử lý kịp thời. Một số triệu chứng nên tuyệt nhiên chú ý gồm:

- Đau đầu, hoa mắt, yếu hoặc mất tê;
- Nhạt mắt, giảm sút thị lực, nhắc chuyện không dễ dàng khăn;
- Cảm giác đau ngực, không dễ thở;
- Đau bụng nặng;
- Cảm giác đau không ít tại bắp chân hoặc đùi.

Dù là biện pháp phòng tránh thai hiệu quả chẩn đoán những tình huống “cấp bách”, nhưng thuốc tránh thai cấp tốc cũng là “con dao hai lưỡi”, có thể dẫn đến nhiều hậu quả đe dọa trầm trọng đến tính mạng và khả năng sinh sản của chị em phụ nữ. Chủ yếu Do đó, chị em không nên dùng quá nhiều kháng sinh. Vận dụng ý kiến bác sĩ chuyên khoa Nhằm được trả lời cách tránh thai hiện đại thích hợp và an toàn.

Trung tâm phụ khoa hệ thống cơ sở y tế Tâm Anh hội tụ hệ thống chuyên gia phụ khoa giỏi tay nghề, nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng đồng hành Cùng với nữ trong chăm sóc tính mệnh sinh sản cũng như dự định hóa gia đình.